



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"IV STANZIALE"

Via Alighiero Noschese, 1 - S. Giorgio a Cremano (NA) C.F. 95186960639 C.M.

NAIC8FG00B e-mail [naic8fg00b@istruzione.it](mailto:naic8fg00b@istruzione.it)

Pec [naic8fg00b@pec.istruzione.it](mailto:naic8fg00b@pec.istruzione.it) Tel/fax 081-275676 081- 470664

Sito web: [www.icquartostanziale.edu.it](http://www.icquartostanziale.edu.it)

PROT.N:10304

DEL 06.12.2024

Ai genitori e docenti degli alunni  
della Scuola Primaria

**Oggetto: Segnalazione scuola Primaria**

Si informano i genitori che nella scuola primaria, presso la sede del plesso Noschese, si è verificato un caso di infezione allo streptococco.

Nell'ambito di un'azione condivisa di educazione alla salute della comunità scolastica, con tale circolare si intende offrire una giusta e corretta **informativa** in caso di malattia infettiva quale la scarlattina.

Definizione

La scarlattina è una malattia infettiva batterica dovuta allo Streptococco beta emolitico di gruppo A. Questo germe può essere responsabile anche di altre malattie quali la tonsillite e l'impetigine (o piodermite, che è un'infezione della cute). Poiché esistono diversi ceppi di questo Streptococco, ci si può ammalare di scarlattina più volte.

E' una malattia che colpisce soprattutto i bambini in età scolare

Descrizione

Ci si contagia da persona a persona, tramite le goccioline respiratorie di saliva, per contatto diretto con un soggetto infetto emesse con la tosse, gli starnuti o anche semplicemente parlando

Un soggetto è molto contagioso durante la fase acuta della scarlattina, è poco infettante nel periodo che precede la malattia, e non lo è più dopo 24-48 ore dall'inizio della terapia antibiotica.

Periodo di incubazione

In seguito al contagio, lo Streptococco si moltiplica nella gola senza dare disturbi per 1-3 giorni, poi la malattia si manifesta.

## Contagiosità

In genere i primi sintomi compaiono dopo 1-3 giorni dal contagio. Di norma un malato è contagioso da 1-2 giorni prima dell'inizio dei sintomi e per tutta la durata della malattia; se viene instaurata un'adeguata terapia antibiotica, dopo 48 ore il soggetto non è più contagioso.

## La prevenzione

L'unico sistema per evitare la scarlattina è quello di tenere lontano i soggetti sani dalle persone già contagiate.

## Cosa fare quando si verifica un caso

Essendo una malattia batterica si cura con idonei antibiotici, anche allo scopo di prevenire la malattia reumatica, per cui, nel sospetto, è sempre bene consultare il medico.

Tenere a casa la persona fino a quando è malata e, comunque, per almeno 48 ore dall'inizio della terapia antibiotica, evitando il contatto diretto con altri bambini.

## Rischio di diffusione nella scuola

La diffusione in ambito scolastico si contrasta con la diagnosi e il trattamento precoce del caso.

La scuola provvederà a svolgere una pulizia approfondita nei locali dove sono stati segnalati casi.

## Riammissione a scuola

Un bambino può tornare in comunità non prima di 48 ore dall'inizio della terapia antibiotica, in ogni caso quando ritorna ad essere in buone condizioni di salute, attestato da regolare certificato medico di pronta guarigione, da consegnare a scuola.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Patrizia Ferrione

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell'art.3 comma 2 dl.vo 39/1993